

FICHA DE TECNICA

1.0 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

Producto final: **RAT-END CEBO**

FRESCO

1.1. Identificación del fabricante:

Nombre: **IMPEX EUROPA S.L.**

Dirección: Avda. de Pontevedra, Nº 39 36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

Cebo raticida LISTO para USAR

Para USO por el público en general, uso ambiental y USO en la INDUSTRIA

2.0 Alimentaria Tipo de principio activo:

Anticoagulante de 2ª generación Familia:

Cumínicos

Tipo de efecto: Anticoagulante de la sangre

Tipo de formulación: 10 gr. de pasta roja en bolsita de papel Filtro Tipo de

intoxicación: Actúa inhibiendo el ciclo de la vitamina K1

COMPOSICIÓN:

Bromadiolona: 0,005 gr.

Benzoato de denatonio: 0,003 gr.

Excipientes csp: 100 gr.

PROPIEDADES:

El formulado contiene una sustancia de sabor amargo con el fin de evitar la ingestión del producto por parte de niños y animales domésticos.

La búsqueda de nuevos raticidas capaces no sólo de combatir la resistencia desarrollada hacia los anticoagulantes tradicionales por el *Rattus Rattus*, el *Rattus norvegicus* y el *Mus musculus*, sino también de mejorar el control en los roedores no resistentes a, conllevado el desarrollo de una nueva generación de excepcionales anticoagulantes dotados de las cualidades raticidas.

RAT-END CEBO FRESCO es un cebo raticida que pertenece a este nuevo tipo de productos anticoagulantes. Es importante destacar que la muerte no sucede inmediatamente, sino a los pocos días de haber iniciado el tratamiento. Por eso, no se conoce rechazo hacia el **RAT-END CEBO FRESCO**, como sucede normalmente con los raticidas de efecto agudo.

TOXICIDAD:

DL 50 oral aguda convencional en rata (D.M. 25 junio 1990)

Bromadiolona 1.1
mg./Kg.

RAT-END CEBO FRESCO

EMPLEO:

RAT-END CEBO FRESCO es rápidamente aceptado por las diversas especies de roedores, gracias a las sustancias atrayentes y al uso de formulantes alimentarios de primera calidad empleados para su formulación. Una de las reglas fundamentales para obtener buenos resultados es la de mantener a disposición de los roedores una cantidad de cebo abundante (25-50 gr. por dosis) y colocar el producto en puntos cercanos entre sí. De este modo, los roedores pueden encontrar y comer el producto fácilmente, sin tener que competir entre ellos. En la primera fase de la desratización es importante que los puntos de distribución sean revisados (diariamente) para reponer el cebo de forma que consigamos un consumo regular en los primeros 2-3 días.

RAT-END CEBO

FRESCO está disponible en presentaciones que permiten su uso en todo tipo de condiciones (zonas húmedas, locales con polvo, en presencia de otros cebos, etc.). Es importante colocar los cebos en lugares donde no suelen estar presentes animales domésticos y esconderlos bien (en estaciones portacebos). Contiene una sustancia de sabor amargo.

ADVERTENCIAS:

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta